

Estruturas Discretas

Marco Molinaro

Indução Forte

Indução Forte X Indução Fraca

Para provar *Propriedade* para todo inteiro $n \geq n_0$ basta mostrar:

Indução (fraca)

- **(Caso base)** Que *Propriedade* vale para n_0
- **(Passo indutivo)** Assume que *Propriedade* **vale para n** , mostra que vale para $n + 1$

Indução Forte X Indução Fraca

Para provar *Propriedade* para todo inteiro $n \geq n_0$ basta mostrar:

Indução (fraca)

- **(Caso base)** Que *Propriedade* vale para n_0
- **(Passo indutivo)** Assume que *Propriedade* **vale para n** , mostra que vale para $n + 1$

Na verdade, no passo indutivo podemos utilizar que a **propriedade vale para todo caso menor ou igual a n** para provar que vale para $n + 1$

Indução Forte X Indução Fraca

Para provar *Propriedade* para todo inteiro $n \geq n_0$ basta mostrar:

Indução (fraca)

- (Caso base) Que *Propriedade* vale para n_0
- (Passo indutivo) Assume que *Propriedade* **vale para n** , mostra que vale para $n + 1$

Na verdade, no passo indutivo podemos utilizar que a **propriedade vale para todo caso menor ou igual a n** para provar que vale para $n + 1$

Indução forte

- (Caso base) Que *Propriedade* vale para n_0
- (Passo indutivo) Assume que propriedade vale para **todos os números $\{n_0, n_0 + 1, \dots, n\}$** , mostra que vale para $n + 1$

Exemplos

Proposição

Para todo $n \geq 2$, n é um produto de alguns números primos (se o número é primo, o produto só tem um termo)

Proposição

Para todo $n \geq 2$, n é um produto de alguns números primos (se o número é primo, o produto só tem um termo)

Prova: Por indução **forte**

Caso base: $n = 2$. A propriedade vale para 2, pois é primo

Proposição

Para todo $n \geq 2$, n é um produto de alguns números primos (se o número é primo, o produto só tem um termo)

Prova: Por indução **forte**

Caso base: $n = 2$. A propriedade vale para 2, pois é primo

Passo Indutivo. Assuma que **todos os números** $\{2, 3, \dots, n\}$ são produtos de alguns números primos

Precisamos mostrar que $n + 1$ é produto de primos

Proposição

Para todo $n \geq 2$, n é um produto de alguns números primos (se o número é primo, o produto só tem um termo)

Prova: Por indução **forte**

Caso base: $n = 2$. A propriedade vale para 2, pois é primo

Passo Indutivo. Assuma que **todos os números** $\{2, 3, \dots, n\}$ são produtos de alguns números primos

Precisamos mostrar que $n + 1$ é produto de primos

Caso 1: $n + 1$ é primo. Neste caso $n + 1$ tem a propriedade desejada

Caso 2: $n + 1$ não é primo. Então $n + 1$ é composto

Caso 2: $n + 1$ não é primo. Então $n + 1$ é composto

Portanto existem naturais a, b diferente de $n + 1$ tal que $n + 1 = a \cdot b$.

Caso 2: $n + 1$ não é primo. Então $n + 1$ é composto

Portanto existem naturais a, b diferente de $n + 1$ tal que $n + 1 = a \cdot b$.

Em particular a, b são menores ou iguais a n

Caso 2: $n + 1$ não é primo. Então $n + 1$ é composto

Portanto existem naturais a, b diferente de $n + 1$ tal que $n + 1 = a \cdot b$.

Em particular a, b são **menores ou iguais a n**

Pela **hipótese indutiva** a é produto de alguns primos, e o mesmo vale para b

Caso 2: $n + 1$ não é primo. Então $n + 1$ é composto

Portanto existem naturais a, b diferente de $n + 1$ tal que $n + 1 = a \cdot b$.

Em particular a, b são menores ou iguais a n

Pela hipótese indutiva a é produto de alguns primos, e o mesmo vale para b

Como $n + 1 = a \cdot b$, $n + 1$ é produto de alguns número primos

Cuidado!

Muito cuidado: Em indução forte, muitas vezes precisamos **provar** mais de um valor de n “na mão”

Cuidado!

Muito cuidado: Em indução forte, muitas vezes precisamos **provar mais de um valor de n “na mão”**

Ou seja, temos múltiplos **casos base**

Exemplo

Considere a sequência a_1, a_2, \dots definida como

- $a_1 = 1, \quad a_2 = 3$
- $a_n = a_{n-2} + 2a_{n-1}$ para todo $n \geq 3$

Exemplo

Considere a sequência a_1, a_2, \dots definida como

- $a_1 = 1, \quad a_2 = 3$
- $a_n = a_{n-2} + 2a_{n-1}$ para todo $n \geq 3$

Proposição

Para todo $n \geq 1$, a_n é ímpar

Exemplo

Considere a sequência a_1, a_2, \dots definida como

- $a_1 = 1, \quad a_2 = 3$
- $a_n = a_{n-2} + 2a_{n-1}$ para todo $n \geq 3$

Proposição

Para todo $n \geq 1$, a_n é ímpar

Prova errada:

Caso base: $n = 1$. Temos que $a_1 = 1$ é ímpar.

Exemplo

Considere a sequência a_1, a_2, \dots definida como

- $a_1 = 1, \quad a_2 = 3$
- $a_n = a_{n-2} + 2a_{n-1}$ para todo $n \geq 3$

Proposição

Para todo $n \geq 1$, a_n é ímpar

Prova errada:

Caso base: $n = 1$. Temos que $a_1 = 1$ é ímpar.

Passo indutivo. Considere $n \geq 1$. Suponha que a propriedade vale para a_1, a_2, \dots, a_n . Precisamos provar que vale para a_{n+1}

Exemplo

Considere a sequência a_1, a_2, \dots definida como

- $a_1 = 1, \quad a_2 = 3$
- $a_n = a_{n-2} + 2a_{n-1}$ para todo $n \geq 3$

Proposição

Para todo $n \geq 1$, a_n é ímpar

Prova errada:

Caso base: $n = 1$. Temos que $a_1 = 1$ é ímpar.

Passo indutivo. Considere $n \geq 1$. Suponha que a propriedade vale para a_1, a_2, \dots, a_n . Precisamos provar que vale para a_{n+1}

Por definição $a_{n+1} = a_{n-1} + 2a_n$. Pela **hipótese indutiva**, a_{n-1} e a_n são ímpares, portanto existem inteiros k, t tal que

$$a_{n-1} = 2k + 1 \quad a_n = 2t + 1$$

Proposição

Para todo $n \geq 1$, a_n é ímpar

Prova errada:

Caso base: $n = 1$. Temos que $a_1 = 1$ é ímpar.

Passo indutivo. Suponha que a propriedade vale para a_1, a_2, \dots, a_n .
Precisamos provar que vale para a_{n+1}

Por definição $a_{n+1} = a_{n-1} + 2a_n$. Pela **hipótese indutiva**, a_{n-1} e a_n são ímpares, portanto existem inteiros k, t tal que

$$a_{n-1} = 2k + 1 \quad a_n = 2t + 1$$

Proposição

Para todo $n \geq 1$, a_n é ímpar

Prova errada:

Caso base: $n = 1$. Temos que $a_1 = 1$ é ímpar.

Passo indutivo. Suponha que a propriedade vale para a_1, a_2, \dots, a_n . Precisamos provar que vale para a_{n+1}

Por definição $a_{n+1} = a_{n-1} + 2a_n$. Pela **hipótese indutiva**, a_{n-1} e a_n são ímpares, portanto existem inteiros k, t tal que

$$a_{n-1} = 2k + 1 \quad a_n = 2t + 1$$

Substituindo na expressão de a_{n+1} temos

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= (2k + 1) + 2 \cdot (2t + 1) \\ &= 2k + 4t + 3 = 2(k + 2t + 1) + 1 \end{aligned}$$

Proposição

Para todo $n \geq 1$, a_n é ímpar

Prova errada:

Caso base: $n = 1$. Temos que $a_1 = 1$ é ímpar.

Passo indutivo. Suponha que a propriedade vale para a_1, a_2, \dots, a_n . Precisamos provar que vale para a_{n+1}

Por definição $a_{n+1} = a_{n-1} + 2a_n$. Pela **hipótese indutiva**, a_{n-1} e a_n são ímpares, portanto existem inteiros k, t tal que

$$a_{n-1} = 2k + 1 \quad a_n = 2t + 1$$

Substituindo na expressão de a_{n+1} temos

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= (2k + 1) + 2 \cdot (2t + 1) \\ &= 2k + 4t + 3 = 2(k + 2t + 1) + 1 \end{aligned}$$

Portanto a_{n+1} é ímpar. Isso conclui o passo indutivo. Fim de prova.

O problema é que tentamos referenciar “2 pra trás” quando usamos $a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1}$, mas isso **não é possível** quando $n + 1 = 2$

$n - 1 = 0$ e a_0 não está definido

O problema é que tentamos referenciar “2 pra trás” quando usamos $a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1}$, mas isso **não é possível** quando $n + 1 = 2$

$$n - 1 = 0 \text{ e } a_0 \text{ não está definido}$$

(Note que esse referencia do tipo “2 pra trás” so acontece em indução **forte**)

O problema é que tentamos referenciar “2 pra trás” quando usamos $a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1}$, mas isso **não é possível** quando $n + 1 = 2$

$$n - 1 = 0 \text{ e } a_0 \text{ não está definido}$$

(Note que esse referencia do tipo “2 pra trás” so acontece em indução **forte**)

Portanto, temos que provar para a_2 “na mão”

Prova **correta**:

Casos base: $n = 1$. Temos que $a_1 = 1$ é ímpar

$n = 2$. Temos que $a_2 = 3$ é ímpar

Prova correta:

Casos base: $n = 1$. Temos que $a_1 = 1$ é ímpar

$n = 2$. Temos que $a_2 = 3$ é ímpar

Passo indutivo. Considere $n \geq 2$. Suponha que a propriedade vale para a_1, a_2, \dots, a_n . Precisamos provar que vale para a_{n+1}

Por definição $a_{n+1} = a_{n-1} + 2a_n$. Pela **hipótese indutiva**, a_{n-1} e a_n são ímpares, portanto existem inteiros k, m tal que

$$a_{n-1} = 2k + 1 \quad a_n = 2t + 1$$

Substituindo na expressão de a_{n+1} temos

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= (2k + 1) + 2 \cdot (2t + 1) \\ &= 2k + 4t + 3 = 2(k + 2t + 1) + 1 \end{aligned}$$

Portanto a_{n+1} é ímpar. Isso conclui o passo indutivo. Fim de prova.

Exercício 1: Prove por indução **forte** que todo valor maior ou igual a \$8 unidades pode ser pago exatamente utilizando apenas essas notas de \$3 e \$5

Verifique que você provou todos os casos base necessários

Exercício 2: Considere o seguinte procedimento

```
Prog2(int n)
If n < 3
    Imprima('Oi') 4 vezes
    Return
Else
    Prog2(n-1)
    Prog2(n-2)
End if
```

Seja $T(n)$ o número de vezes que a palavra “OI” é impressa quando Prog2 é chamado com parâmetro n

Prove por indução (forte) que $T(n) \leq 4 \cdot (7/4)^n$ pra todo $n \geq 1$